

レジメン名	薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由				
大腸1	セロゲ	1	か`シタピン	2000	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		軽	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
大腸2	LV+UFT	1	ユーベル	75	mg/body	内服	1日3回8時間毎	1~28	5		軽	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん 強力な治療が適応とならない患者		
		2	UFT	300	mg/m ²	内服							1~28	
大腸3	TS-1	1	エヌワン	80	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~28	6		軽	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
大腸4	ロンサフ	1	ロンサフ	70	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1`5 8`12	4		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
大腸5	スチハ`ガ	1	スチハ`ガ	160	mg/body	内服	1日1回朝食後	1~21	4		軽	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
大腸6	XELOX	1	か`シタピン	2000	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	エルブ`ラット	130	mg/m ²	div	2時間						1	△
大腸7	TS-1+CPT-11 (125)	1	エヌワン	80	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~14	4		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	カンプト	125	mg/m ²	div	90分						1`14	△
大腸8	TS-1+CPT-11 (150)	1	エヌワン	80	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	カンプト	150	mg/m ²	div	90分						1	△
大腸9	RPM1	1	レホ`ネリナート	250	mg/m ²	div	2時間	1`8`15`22`29`36	8		軽	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	5-FU	600	mg/m ²	bolus	LV開始1時間後に全開						1`8`15`22`29`36	△
大腸10	sLVFU2	1	レホ`ネリナート	200	mg/m ²	div	2時間	1	2		軽	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	5-FU	400	mg/m ²	bolus	LV終了後全開						△	
		3	5-FU (持続)	2400	mg/m ²	46時間持続	②終了後46時間で						△	
大腸11	m-FOLFOX6	1	レホ`ネリナート	200	mg/m ²	div	②③同時投与2時間	1	2		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	エルブ`ラット	85	mg/m ²	div	②③同時投与2時間						△	
		3	5-FU	400	mg/m ²	bolus	②終了後全開						△	
		4	5-FU (持続)	2400	mg/m ²	46時間持続	③終了後46時間で						△	
大腸12	FOLFIRI	1	レホ`ネリナート	200	mg/m ²	div	②③同時投与2時間	1	2		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	カンプト	150	mg/m ²	div	②③同時投与2時間						△	
		3	5-FU	400	mg/m ²	bolus	②終了後全開						△	
		4	5-FU (持続)	3200	mg/m ²	46時間持続	③終了後46時間で						△	
大腸13	CPT-11 (100)	1	カンプト	100	mg/m ²	div	90分	1`8`15` (22)	4 (5)	△	中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
大腸14	SOX	1	エヌワン	80	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	エルブ`ラット	130	mg/m ²	div	2時間						1	△
大腸15	FOLFOXIRI	1	エルブ`ラット	85	mg/m ²	div	2時間	1	2		高	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		3	カンプト	165	mg/m ²	div	②投与30分後から90分かけて						1	△
		2	l-LV	200	mg/m ²	div	2時間						1	
		4	5-FU (持続)	2400	mg/m ²	持続静注	46時間持続						1	△
大腸16	ニホ`ルマブ`2週毎	1	オプ`ジーホ`	240	mg/body	div	30分かけて	1	2		最小	癌化学療法後に憎悪した治療切除不能なMSI-HIを有する結腸・直腸癌		
大腸17	ニホ`ルマブ`4週毎	1	オプ`ジーホ`	480	mg/body	div	30分かけて	1	4		最小	癌化学療法後に憎悪した治療切除不能なMSI-HIを有する結腸・直腸癌		
大腸18	ニホ`ルマブ`+化`リマブ`	1	オプ`ジーホ`	240	mg/body	div	30分かけて	1	3その後2		最小	化学療法未治療の治療切除不能なMSI-HIを有する結腸・直腸癌 ニホ`ルマブ`は1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注しその後は240mgを2週間間隔。化`リマブ`は3週間間隔で4回投与。		
		2	ヤ`ホ`イ	1	mg/kg	div	30分かけて							
大腸19	XELIRI	1	セロゲ	800	mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治療切除不能な進行・再発の結腸直腸がん		
		2	カンプト	200	mg/m ²	div	90分						1	△

ｼﾞﾞﾈﾝ名		薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
大腸20	ヘルツスマブ+トラスツブ	1	ﾊｰｼﾞ ﾍﾞｸ	※	mg/body	div	初回90分、2回目以降30分	1	3	最小	がん化学療法後に憎悪したHER2要請の治癒切除不能な進行再発の結腸直腸癌※ﾊｰｼﾞ ﾍﾞｸ: 初回8、2回目以降6	
		2	ﾊｰセﾌﾞ ﾁﾝ	※	mg/body	div	初回90分、2回目以降30分	1				
ｼﾞﾞﾈﾝ名		薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
大腸81	BEV+せ'ローダ'	1	ｶﾞﾝｼﾞ ﾍﾞﾝ	2000	mg/㎡	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		軽	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	7.5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1				
大腸82	BEV+XELOX	1	ｶﾞﾝｼﾞ ﾍﾞﾝ	2000	mg/㎡	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	7.5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1				
		3	ｴﾙﾌﾞ ﾗｯﾄ	130	mg/㎡	div	2時間	1				
大腸83	BEV+m-FOLFOX6	1	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1	2	△	中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾚﾊ' ﾗﾘﾅｰﾄ	200	mg/㎡	div	②③同時投与2時間					
		3	ｴﾙﾌﾞ ﾗｯﾄ	85	mg/㎡	div	②③同時投与2時間					
		4	5-FU	400	mg/㎡	bolus	②終了後全開					
		5	5-FU(持続)	2400	mg/㎡	46時間持続	③終了後46時間で					
大腸84	BEV+FOLFIRI	1	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1	2	△	中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾚﾊ' ﾗﾘﾅｰﾄ	200	mg/㎡	div	②③同時投与2時間					
		3	ｶﾝﾌﾟﾄ	150	mg/㎡	div	②③同時投与2時間					
		4	5-FU	400	mg/㎡	bolus	②終了後全開					
		5	5-FU(持続)	2400	mg/㎡	46時間持続	③終了後46時間で					
大腸85	BEV+sLVFU2	1	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1	2	△	軽	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾚﾊ' ﾗﾘﾅｰﾄ	200	mg/㎡	div	2時間					
		3	5-FU	400	mg/㎡	bolus	LV終了後全開					
		4	5-FU(持続)	2400	mg/㎡	46時間持続	②終了後46時間で					
大腸86	BEV+RPM1	1	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1・15・29	8		軽	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾚﾊ' ﾗﾘﾅｰﾄ	250	mg/㎡	div	2時間	1・8・15・22・29・36				
		3	5-FU	600	mg/㎡	bolus	LV開始1時間後に全開	1・8・15・22・29・36				
大腸87	BEV+S0X	1	ｴｽｸﾞﾝ	80	mg/㎡	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	7.5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1				
		3	ｴﾙﾌﾞ ﾗｯﾄ	130	mg/㎡	div	2時間	1				
大腸88	BEV+TS-1+CPT-11	1	ｴｽｸﾞﾝ	80	mg/㎡	内服	1日2回朝夕食後	1~14	4		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1・15				
		3	ｶﾝﾌﾟﾄ	125	mg/㎡	div	90分	1・14				
大腸89	BEV+FOLFIRI	1	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1	2	△	高	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ｴﾙﾌﾞ ﾗｯﾄ	85	mg/㎡	div	2時間	1				
		3	ｶﾝﾌﾟﾄ	165	mg/㎡	div	②投与30分後から90分かけて	1				
		4	l-LV	200	mg/㎡	div	2時間	1				
		5	5-FU(持続)	3200	mg/㎡	持続静注	46時間持続	1				
大腸810	BEV+TS-1+CPT-11	1	ｴｽｸﾞﾝ	80	mg/㎡	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん
		2	ﾌﾊ' ﾍﾞﾝ	7.5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1・15				
		2	ｶﾝﾌﾟﾄ	150	mg/㎡	div	90分	1・14				

ｼﾞﾞﾝ名		薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由		
大腸B11	BEV+ロソフ	1	ロソフ	70	mg/ml	内服	1日2回朝夕食後	1~5 8~12	4		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
		2	7α ステン	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1・15					
大腸B12	BEV+XELIRI	1	ゼローダ	800	mg/ml	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
		2	7α ステン	7.5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1					
		3	カンプト	200	mg/ml	div	90分	1					
大腸B13	BEV+ロソフbiweek	1	ロソフ	70	mg/ml	内服	1日2回朝夕食後	1~5 15~19	4		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
		2	7α ステン	5	mg/kg	div	初回90分2回目60分3回目以降30分	1・15					
ｼﾞﾞﾝ名		薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由		
大腸C1	Cmab単独	1	アビーダックス (初回)	400	mg/ml	div	2時間	1	1		最小	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
			アビーダックス (2回目以降)	250	mg/ml		1時間						
大腸C2	Cmab +XELOX	1	カベシタビン	2000	mg/ml	内服	1日2回朝夕食後	1~14	3		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
		2	アビーダックス (初回)	400	mg/ml	div	2時間	1・8・15					
			アビーダックス (2回目以降)	250	mg/ml		1時間						
3	エルブラット	130	mg/ml	div	2時間	1	△						
大腸C3	Cmab+m-FOLFOX6	1	アビーダックス (初回)	400	mg/ml	div	2時間	1・8	2		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
			アビーダックス (2回目以降)	250	mg/ml		1時間						
		2	レボレチナート	200	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					
		3	エルブラット	85	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					△
		4	5-FU	400	mg/ml	bolus	②終了後全開	1					△
5	5-FU(持続)	2400	mg/ml	46時間持続	③終了後46時間で	1	△						
大腸C4	Cmab+FOLFIRI	1	アビーダックス (初回)	400	mg/ml	div	2時間	1・8	2		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
			アビーダックス (2回目以降)	250	mg/ml		1時間						
		2	レボレチナート	200	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					
		3	カンプト	150	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					△
		4	5-FU	400	mg/ml	bolus	②終了後全開	1					△
5	5-FU(持続)	2400	mg/ml	46時間持続	③終了後46時間で	1	△						
大腸C5	Cmab +CPT-11(12)	1	アビーダックス (初回)	400	mg/ml	div	2時間	1	2		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
			アビーダックス (2回目以降)	250	mg/ml		1時間						
		2	カンプト	125	mg/ml	div	90分						△
大腸C6	Cmab単独 : biweek	1	アビーダックス	500	mg/ml	div	初回2時間2回目90分3回目以降1時間	1	2		最小	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
大腸C7	Cmab : biweekly +m-FOLFOX6	1	アビーダックス	500	mg/ml	div	初回2時間2回目90分3回目以降1時間	1	2		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
		2	レボレチナート	200	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					
		3	エルブラット	85	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					△
		4	5-FU	400	mg/ml	bolus	②終了後全開	1					△
		5	5-FU(持続)	2400	mg/ml	46時間持続	③終了後46時間で	1					△
大腸C8	Cmab : biweekly +FOLFIRI	1	アビーダックス	500	mg/ml	div	初回2時間2回目90分3回目以降1時間	1	2		中	治癒切除不能な進行・再発の結腸直腸がん	
		2	レボレチナート	200	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					
		3	カンプト	150	mg/ml	div	②③同時投与2時間	1					△
		4	5-FU	400	mg/ml	bolus	②終了後全開	1					△
		5	5-FU(持続)	2400	mg/ml	46時間持続	③終了後46時間で	1					△

ｼﾞﾞﾝ名	薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
大腸術後4	XELOX術後	1	カヘシタビン	2000 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~14	3	中	大腸癌術後補助化学療法	
		2	エルブラット	130 mg/m ²	div	2時間	1				△
大腸術後5	m-FOLFOX6術後	1	レボレチナート	200 mg/m ²	div	①②同時投与2時間	1	2	中	大腸癌術後補助化学療法	
		2	エルブラット	85 mg/m ²	div	①②同時投与2時間	1				△
		3	5-FU	400 mg/m ²	bolus	②終了後全開	1				△
		4	5-FU(持続)	2400 mg/m ²	46時間持続	③終了後46時間で	1				△
ｼﾞﾞﾝ名	薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
胃がん1	S1+CDDP(25)	1	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~21	5	高	切除不能進行・再発胃がん	
		2	ジスプラチン	25 mg/m ²	div	2時間	8-15-22				△
胃がん2	S1+CDDP(60)q5w	1	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~21	5	高	切除不能進行・再発胃がん	
		2	ジスプラチン	60 mg/m ²	div	2時間	8				△
胃がん3	TS-1	1	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~28	6		軽	切除不能進行・再発胃がん
胃がん4	CDDP+CPT-11	1	カンプト	70 mg/m ²	div	90分	1-15	4	高	切除不能進行・再発胃がん	
		2	ジスプラチン	80 mg/m ²	div	2時間	1				△
胃がん5	5-FU+L-LV	1	5-FU	600 mg/m ²	div	2時間	1-8-15-22-29-36	8	△	軽	切除不能進行・再発胃がん
		2	レボレチナート	250 mg/m ²	bolus	LV開始1時間後に全開	1-8-15-22-29-36				
胃がん6	wPTX	1	パクリタセル	80 mg/m ²	div	初回2時間2回目以降1時間	1-8-15	4	★	軽	切除不能進行・再発胃がん
胃がん7	nab-PTX	1	アブラキサン	260 mg/m ²	div	30分	1	3	★	軽	切除不能進行・再発胃がん
胃がん8	DOC	1	ドセキセル	60 mg/m ²	div	1時間	1	3	△	軽	切除不能進行・再発胃がん
胃がん9	CPT-11(100)	1	カンプト	100 mg/m ²	div	90分かけて	1-8-15-(22)	4(5)	△	中	切除不能進行・再発胃がん
胃がん10	CPT-11(150)	1	カンプト	150 mg/m ²	div	90分かけて	1-15-(29)	5(7)	△	中	切除不能進行・再発胃がん
胃がん11	XP	1	カヘシタビン	2000 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~14	3	高	切除不能進行・再発胃がん	
		2	ジスプラチン	80 mg/m ²	div	2時間	1				△
胃がん12	GSOX	1	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~14	3	中	切除不能進行・再発胃がん	
		2	エルブラット	100 mg/m ²	div	2時間	1				△
胃がん13	ハセブチン療法(併用)	1	ハセブチン(初回)	8 mg/kg	div	90分以上	1	3	最小	HER2過剰発現が確認された切除不能進行・再発胃がん	
		2	ハセブチン(2回目以降)	6 mg/kg	div	30分					
胃がん14	ハセブチン+XP	1	ハセブチン(初回)	8 mg/kg	div	90分以上	1	3	高	HER2過剰発現が確認された切除不能進行・再発胃がん	
		2	ハセブチン(2回目以降)	6 mg/kg	div	30分					
		2	カヘシタビン	2000 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~14				
3	ジスプラチン	80 mg/m ²	div	2時間	1	△					
胃がん15	サイラムザ	1	サイラムザ	8 mg/kg	div	初回60分、2回目以降30分	1	2		最小	切除不能進行・再発胃がん
胃がん16	サイラムザ+wPTX	1	サイラムザ	8 mg/kg	div	初回60分、2回目以降30分	1-15	4	★	軽	切除不能進行・再発胃がん
		2	パクリタセル	80 mg/m ²	div	初回2時間2回目以降1時間	1-8-15				
胃がん17	XELOX	1	カヘシタビン	2000 mg/m ²	内服	1日2回朝食後	1~14	3	中	切除不能進行・再発胃がん	
		2	エルブラット	130 mg/m ²	div	2時間	1				△
胃がん18	m-FOLFOX6	1	レボレチナート	200 mg/m ²	div	②③同時投与2時間	1	2	中	切除不能進行・再発胃がん	
		2	エルブラット	85 mg/m ²	div	②③同時投与2時間					
		3	5-FU	400 mg/m ²	bolus	②終了後全開					
		4	5-FU(持続)	2400 mg/m ²	46時間持続	③終了後46時間で					

ｼﾞｼﾞﾝ名	薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
胃がん19	ニボルマブ 2週毎	1	オプジーブ	240 mg/body	div	30分かけて	1	2		最小	切除不能進行・再発胃がん
胃がん20	サイラムザ + wnab PT	1	サイラムザ	8 mg/kg	div	初回60分、2回目以降30分	1・15	4	★	軽	切除不能進行・再発胃がん
		2	アブリキシチン	100 mg/m ²	div	30分	1・8・15				
胃がん21	ロンサーフ	1	ロンサーフ	70 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・5 8・12	4		中	切除不能進行・再発胃がん
胃がん22	S1 + CDDP (60) q3	1	エスワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・14	3	△	高	切除不能進行・再発胃がん
		2	シスプラチン	60 mg/m ²	div	2時間	1				
胃がん23	ニボルマブ 4週毎	1	オプジーブ	480 mg/body	div	30分かけて	1	4		最小	切除不能進行・再発胃がん
胃がん24	ニボルマブ + SOX	1	オプジーブ	360 mg/body	div	30分かけて	1	3	△	中	切除不能進行・再発胃がん
		2	エスワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・14				
		3	エルブラット	100 mg/m ²	div	2時間	1				
胃がん25	ニボルマブ + XELOX	1	オプジーブ	360 mg/body	div	30分かけて	1	3	△	中	切除不能進行・再発胃がん
		2	カヘシタヒン	2000 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・14				
		3	エルブラット	130 mg/m ²	div	2時間	1				
胃がん26	ニボルマブ + m-FOLFIRI	1	オプジーブ	240 mg/body	div	30分かけて	1	2	△	中	切除不能進行・再発胃がん
		2	レキネリナト	200 mg/m ²	div	②③同時投与2時間					
		3	エルブラット	85 mg/m ²	div	②③同時投与2時間					
		4	5-FU	400 mg/m ²	bolus	②終了後全開					
		5	5-FU(持続)	2400 mg/m ²	46時間持続	③終了後46時間で					
ｼﾞｼﾞﾝ名	薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
胃がん術後1	TS1術後	1	エスワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・28	6		中	胃がん術後補助化学療法。術後46日以内に投与開始、12ヶ月継続。
胃がん術後2	UFT術後	1	UFT	360 mg/m ²	内服	1日3回毎食後	1・5	1		軽	胃がん術後補助化学療法。術後6週以内に投与開始、術後16ヶ月継続。
胃がん術後3	XELOX術後	1	カヘシタヒン	2000 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・14	3	△	中	胃癌術後補助化学療法
		2	エルブラット	130 mg/m ²	div	2時間	1				
胃がん術後4	SOX術後	1	エスワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・14	3	△	中	胃癌術後補助化学療法
		2	エルブラット	100 mg/m ²	div	2時間	1				
胃がん術後5	S1 + DTX術後	1	エスワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1・14 (1~28)	3 (6)	△	中	stage III胃癌術後補助化学療法 1年継続 (S1は21~8クール目WIR9クール目以降4W2R、DTXは2~8クール目のみDAY1)
		2	トセキセル	40 mg/m ²	div	1時間 (2クール目から7クール目のみ)	1				
ｼﾞｼﾞﾝ名	薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
食道がん1	5-FU/CDDP (FP)	1	シスプラチン	80 mg/m ²	DIV	2時間	1	4	△	高	進行・再発食道がん
		2	5-FU	800 mg/m ²	DIV	24時間持続	1・5				
食道がん2	DOC	1	トセキセル	70 mg/m ²	DIV	1時間	1	3	△	軽	CDDPを含む初回治療に抵抗性となった転移性再発食道がんの二次治療
食道がん3	wPTX	1	パクリタセル	100 mg/m ²	DIV	初回2時間時間 2回目以降1時間	1・8・15・22・29・36	7	★	軽	進行・再発食道がん
食道がん4	ニボルマブ 2週毎	1	オプジーブ	240 mg/body	div	30分かけて	1	2		最小	癌化学療法後に憎悪した根治切除不能な進行再発食道がん
食道がん5	ヘムジリン マブ 3週毎	1	キイトルーダ	200 mg/body	div	30分かけて	1	3		最小	癌化学療法後に憎悪した根治切除不能な進行再発食道がん
食道がん6	ヘムジリン マブ 6週毎	1	キイトルーダ	400 mg/body	div	30分かけて	1	6		最小	癌化学療法後に憎悪した根治切除不能な進行再発食道がん
食道がん7	ニボルマブ 4週毎	1	オプジーブ	480 mg/body	div	30分かけて	1	4		最小	癌化学療法後に憎悪した根治切除不能な進行再発食道がん
食道がん8	ヘムジリン マブ + 5-FU/CDDP (FP)	1	キイトルーダ	200 mg/body	div	30分かけて	1	3	△	高	根治切除不能な進行・再発の食道癌
		2	シスプラチン	80 mg/m ²	DIV	2時間:最大6コース	4				
		3	5-FU	800 mg/m ²	DIV	24時間持続	1・5				

ｼﾞﾝﾀﾞﾝ名	薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
胆・膵がん1	GEM	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1・8・15	4	△	軽	切除不能進行・再発膵臓癌/切除不能胆道がん
胆・膵がん2	TS-1	1	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~28	6		軽	切除不能進行・再発膵臓癌/切除不能胆道がん
胆・膵がん3	GS	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1・8	3	△	中	切除不能進行・再発膵臓癌/切除不能胆道がん
		2	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~14		△		
胆・膵がん4	GC	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1・8	3	△	中	切除不能進行・再発膵臓癌/切除不能胆道がん
		2	ジスプラチン	25 mg/m ²	DIV	60分	1・8		△		
胆・膵がん5	GEM+nab-PTX	1	アブラキサン	125 mg/m ²	DIV	30分	1・8・15	4	△	中	治癒切除不能膵臓癌
		2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1・8・15		△		
胆・膵がん6	FOLFIRINOX	1	エルブラット	85 mg/m ²	DIV	2時間	1	2	△	高	治癒切除不能膵臓癌
		2	I-LV	200 mg/m ²	DIV	2時間	1		△		
		3	カナプト	180 mg/m ²	DIV	②投与30分後から90分かけて	1		△		
		4	5-FU	400 mg/m ²	bolus	bolus	1		△		
		5	5-FU (持続)	2400 mg/m ²	持続静注	46時間持続	1		△		
胆・膵がん7	m- FOLFIRINOX	1	エルブラット	85 mg/m ²	DIV	2時間	1	2	△	高	治癒切除不能膵臓癌
		2	I-LV	200 mg/m ²	DIV	2時間	1		△		
		3	カナプト	150 mg/m ²	DIV	②投与30分後から90分かけて	1		△		
		4	5-FU (持続)	2400 mg/m ²	持続静注	46時間持続	1		△		
胆・膵がん8	Nal-IRI+FL	1	オニバルト	70 mg/m ²	DIV	90分かけて	1	2	△	中	治癒切除不能膵臓癌
		2	I-LV	200 mg/m ²	DIV	2時間かけて	1		△		
		3	5-FU (持続)	2400 mg/m ²	持続静注	②終了後46時間持続	1		△		
胆・膵がん9	GCS	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1	3	△	中	切除不能進行・再発膵臓癌/切除不能胆道がん
		2	ジスプラチン	25 mg/m ²	DIV	60分	1		△		
		3	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~7				
胆・膵がん10	デュルバルマブ+GC	1	イミフィング	1500 mg/body	div	60分	1	3	△	中	切除不能進行・再発膵臓癌/切除不能胆道がん ※最大8ヶル
		2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1・8		△		
		3	ジスプラチン	25 mg/m ²	DIV	60分	1・8		△		
胆・膵がん11	デュルバルマブ	1	イミフィング	1500 mg/m ²	DIV	30分	1	4	△	最小	切除不能進行・再発膵臓癌/切除不能胆道がん
ｼﾞﾝﾀﾞﾝ名	薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
膵がん術後1	S1	1	エヌワン	80 mg/m ²	内服	1日2回朝夕食後	1~28	6		軽	膵臓癌術後補助化学療法 4ヶル
膵がん術後2	GEM	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1・8・15	4	△	軽	膵臓癌術後補助化学療法 6ヶル
ｼﾞﾝﾀﾞﾝ名	薬剂名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
固形がん1	ヘムリンマブ 3週毎	1	キイトセク	200 mg/body	DIV	30分	1	3		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)
固形がん2	ヘムリンマブ 6週毎	1	キイトセク	400 mg/body	DIV	30分	1	6		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)
固形がん3	ニキルマブ 2週毎	1	ワジネホ	240 mg/body	div	30分かけて	1	2		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)
固形がん4	ニキルマブ 4週毎	1	ワジネホ	480 mg/body	div	30分かけて	1	4		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)

病名	薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
膀胱がん1	EPI膀胱注入	1	エトルビシ	30 mg/body	膀胱注入	1				膀胱がん治療	
膀胱がん2	THP膀胱注入	1	ヒノルビシ	30 mg/body	膀胱注入	1				膀胱がん治療	
膀胱がん3	BCG膀胱注入	1	イムノラゲ (導入)	80 mg/body	膀胱注入	1・8・15・22・29・36	6			膀胱がん治療	
		イムノラゲ (維持)	1・8・15			3					
	2	グラビット	1 mg/body	内服	1日1回	日から夕食後2日間内服					
膀胱がん4	M-VAC	1	メトトレート	30 mg/m ²	div	4時間	1・15・22	4	★ ★ △	高	膀胱がん・上皮尿路がん (腎盂・尿管がん) 注
		2	エタゾール	3 mg/m ²	div	30分	2・15・22				
		3	アドリアシン	30 mg/m ²	div	30分	2				
		4	シスプラチン	70 mg/m ²	div	2時間	2				
膀胱がん5	GC	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	div	30分	1・8・15	4	△ △	高	膀胱がん・上皮尿路がん (腎盂・尿管がん) 注
		2	シスプラチン	70 mg/m ²	div	2時間	2				
膀胱がん6	TN	1	パクリタセル	210 mg/m ²	div	3時間	1	3	★ △	高	膀胱がん・上皮尿路がん (腎盂・尿管がん) 注
		2	アクリン	100 mg/m ²	div	2時間	2				
膀胱がん7	Gカルボ	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	div	30分	1・8・15	4	△ △	中	膀胱がん・上皮尿路がん (腎盂・尿管がん) 注
		2	カルボプラチン	5 AUC	div	1時間	2				
膀胱がん8	GEM	1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	DIV	30分	1・8・15	4	△	軽	膀胱がん・上皮尿路がん (腎盂・尿管がん) 注
膀胱がん9	ヘムロリス マブ 3週	1	キトルガ	200 mg/body	DIV	30分	1	3		最小	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん
膀胱がん10	ヘムロリス マブ 6週	1	キトルガ	400 mg/body	DIV	30分	1	6		最小	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん
膀胱癌11	エンボキサマブ ヘムロリス	1	パドセブ	1.25 mg/m ²	DIV	30分	1・8・15	4		軽度	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌
病名	薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
前立腺がん1	DOC	1	ドセタセル	70 mg/m ²	div	1時間以上かけて	1	3	△	軽	前立腺がん
前立腺がん2	アビラロン	1	ザイイカ	1000 mg/body	内服	連日 1日1回空腹時	1				前立腺がん
		2	アトレチン	10 mg/body	内服	連日 1日2回朝夕食後					
前立腺がん3	エンザルタミド	1	イクスタン	160 mg/body	内服	連日 1日1回	1				前立腺がん
前立腺がん4	アパルタミド	1	アパルタ	240 mg/body	内服	連日 1日1回	1				遠隔転移を有しない前立腺がん
前立腺がん5	カバジタセル	1	ジエブタ	25 mg/m ²	div	1時間かけて	1	3	★	軽	前立腺がん
		2	アトレチン	10 mg/body	内服	連日 1日2回朝食後					
		3	ジネラス	3.6 mg/body	皮下注		3				
前立腺がん6	ゲムシタビン	1	ニューケ	1200 mg/body	内服	連日 1日1回	1				前立腺がん
病名	薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
腎細胞がん1	テムロリムス	1	トリセル	25 mg/body	div	1時間	1			最小	根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん2	スチニフ	1	スチニフセル	50 mg/body	内服	1日1回	1~14	3		最小	根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん3	エムロリムス	1	アフィニール	10 mg/body	内服	1日1回	連日				根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん4	アキチニフ	1	アキチニフ	10 mg/body	内服	1日2回	連日				根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん5	パゾパニフ	1	ゲオトリント	800 mg/body	内服	1日1回	連日				根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん6	ソラフェニフ	1	ネサバル	800 mg/body	内服	1日1回	連日				根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん7	ニボルマブ 2週毎	1	オゾジホ	240 mg/body	div	30分かけて	1	2		最小	根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん8	ヘムロリス マブ 3週	1	キトルガ	200 mg/body	div	30分	1	3		最小	根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん9	ヘムロリス マブ 6週	1	キトルガ	400 mg/body	div	30分	1	6		最小	根治切除不能または転移性の腎細胞がん
腎細胞がん10	ニボルマブ 4週毎	1	オゾジホ	480 mg/body	div	30分かけて	1	4		最小	根治切除不能または転移性の腎細胞がん

病名		薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
肝がん1	抗癌剤動注・塞栓療法 (TACE)	1	アトリアシン	10~20	mg/body	動注		1	★		肝細胞癌	
		2	マイトマイシン	2~10	mg/m ²							
		3	リビトール	2~10	ml/body							
肝がん2	抗癌剤動注・塞栓療法 (TACE) : エピルビシン	1	エピルビシン	10~20	mg/body	動注		1	★		肝細胞癌	
		2	リビトール	2~10	ml/body							
肝がん3	7E7 リスマブ + BEV	1	7E7 リスマブ	1200	mg/body	DIV	初回60分2回目以降30分	1	3	最小	肝細胞癌	
		2	7E7 スチン	15	mg/kg		初回90分2回目60分3回目以降30分					
肝がん4	レンパチニブ	1	レンピマ	※	mg/body	経口	1日1回	連日		中	切除不能な肝細胞癌 ※60kg 以上の場合は12mg60kg未満の場合は8mg	
肝がん5	サイラムザ	1	サイラムザ	8	mg/kg	div	初回60分、2回目以降30分	1	2	最小	がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌	
病名		薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
固形がん1	パムパロキサマブ 3w	1	キトルガ	200	mg/body	div	30分	1		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に服す)	
固形がん2	パムパロキサマブ 6w	1	キトルガ	400	mg/body	div	30分	1		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に服す)	
固形がん3	ニボルマブ 2w	1	オプジーボ	240	mg/body	div	30分	1		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に服す)	
固形がん4	ニボルマブ 4w	1	オプジーボ	480	mg/body	div	30分	1		最小	がん化学療法後に増悪した進行・再発のMSI-Highを有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に服す)	
病名		薬剤名 (商品名)	用量	単位	ルート	投与速度	day	1クール(週)	漏出リスク	嘔吐リスク	投与理由	
悪性リンパ腫1	R-CHOP	1	リツキサン	375	mg/m ²		注意事項参照	1	21	★	高	進行期びまん性大細胞型B型細胞性リンパ腫
		3	エンドキサン	750	mg/m ²		3時間かけて	1				
		4	アトリアシン	50	mg/m ²		1時間かけて	1				
		5	オコピン	1.4	mg/m ²		15分かけて	1				
		2	ブレドニン	100	mg/body		1日2回内服またはDIV	1~5				
悪性リンパ腫2	リツキサン	1	リツキサン	375	mg/m ²		注意事項参照	1	7	最小	進行期びまん性大細胞型B型細胞性リンパ腫	
悪性リンパ腫3	CHOP	1	ブレドニン	100	mg/body		1日2回内服またはDIV	1~5	21	★	高	進行期びまん性大細胞型B型細胞性リンパ腫
		2	エンドキサン	750	mg/m ²		3時間かけて	1				
		3	アトリアシン	50	mg/m ²		1時間かけて	1				
		4	オコピン	1~1.4	mg/m ²		15分かけて	1				

△炎症性 ★壊死性